



Umor i gubitak koncentracije - depresija ili uremijski sindrom

V. Klarić¹, D. Klarić¹

¹Opća bolnica Zadar, Bože Peričića 5, 23000 Zadar, Hrvatska

dragon.klaric@gmail.com

UVOD

Umor i gubitak koncentracije su česti simptomi kod uremičnih i depresivnih bolesnika. Njihova jasna diferencijacija može pomoći u liječenju jednog broja bolesnika.



Slika 1. Depresija, ilustracija

METODE I ISPITANICI

Standardnim postupcima analizirali smo jedan dijalizni Centar od 100 bolesnika. Isključili smo bolesnike s kognitivnim deficitima i postojećim psihijatrijskim dijagnozama. Svi ispitanici su imali istu metodu liječenja, istu frekvenciju postupaka, a doza dijalize je bila u preporučenom rasponu. 48 bolesnika (54,1%) koji su imali umor i gubitak koncentracije ispitivani su Hamiltonovom ocjenskom ljestvicom za depresiju te je kod njih 19 potvrđena depresija (58% muškaraca i 42% žena), bilo da se radilo o blagoj, srednje teškoj ili teškoj depresiji. Depresiju s simptomima nismo pronašli.

RASPRAVA

Depresivni poremećaji su česti kod bolesnika na dijalizi obzirom da je tjelesna bolest velik stresor za čovjeka. Pravovremeno diferenciranje pacijenata s depresivnim poremećajem je važno jer im se može kvalitetno pomoći. Umor, pospanost i gubitak koncentracije su česti simptomi kod uremičnih i kod depresivnih bolesnika, mada se često svi ti simptomi svrstavaju pod „razne poremećaje u sklopu uremijskog sindroma i njegovog liječenja“. Depresiju je važno prepoznati kao komorbiditet koji se može efikasno liječiti.

1. Depresivno raspoloženje (tuga, beznadnost, bespomoćnosti, bezvrijednost)
0 Nije prisutno * 1 Ovakvo emocionalno doživljavanje iskazano je samo na izravnji upit * 2 Govorno izražava i bez upita * 3 Emocionalno doživljavanje iskazuje neverbalno * 4 Bolesnik gotovo isključivo govori o tome u svojoj spontanoj komunikaciji
2. Osjećaj krivnje
0 Nije prisutan * 1 Samopredbacivanje * 2 Osjećaj krivnje ili stalno razmišljanje o proteklim greškama i propustima * 3 Sadašnja bolest smatra kaznom. * 4 Čuje optuživačke ili prijetiće glasove i/ili prisutnost vidnih halucinacija pripojene sadržaju
3. Samoubilački porivi
0 Nisu prisutni * 1 Osjeća da život nema vrijednosti * 2 Želja za smrću ili bilo koje misli o mogućoj smrti * 3 Samoubilačke misli ili geste * 4 Pokušaji suicida
4. Smetnje usnivanja
0 Bez teškoća kod usnavljivanja * 1 Žali se na povremene teškoće kod usnavljivanja koje traju dulje od pola sata * 2 Žali se na svakodnevne teškoće kod usnavljivanja
5. Smetnje spavanja (prosnivanja)
0 Nisu prisutne * 1 Bolesnik se žali na nemir i isprekidan san * 2 Budenje tijekom noći
6. Jutarnje smetnje spavanja
0 Nisu prisutne * 1 Budi se rano ujutro, ali ponovno zaspri * 2 Ne može ponovno zaspasti ako rano ustane
7. Rad i aktivnost
0 Nema teškoća kod usnavljivanja * 1 Osjeća se nesposobnim, umornim ili slabim kod radnih i slobodnih aktivnosti * 2 Gubitak zanimanja za rad i aktivnosti * 3 Skraćenje vremena potrošenog na aktivnosti ili smanjenje produktivnosti * 4 Prestanak rada zbog sadašnje bolesti.
8. Usporenost (psihomotorna inhibicija)
0 Uredni govor i mižljene * 1 Blaga usporenost kod pregleda (razgovora) * 2 Očita usporenost kod pregleda * 3 Pregled/razgovor izrazito otežan * 4 Stupor
9. Agitacija
0 Nije prisutna * 1 Uznemirenost * 2 Igra se rukama, kosom i sl. 3 Ne može mirno sjediti * 4 Lomi ruke, grize nokte, čupa kosu, grize usnice
10. Ankloznost - psihička (psihički strah)
0 Nije prisutna * 1 Unutarnja napetost i razdražljivost * 2 Zabrinutost oko sitnica * 3 Izraz ustrašenosti u govoru i licu * 4 Izražava strah i bez upita
11. Ankloznost - somatska (tjelesni strah)
0 Nije prisutna * 1 Neznanja * 2 Umjerena * 3 Jaka * 4 Onesposobljuje bolesnika
12. Gastrointestinalni simptomi
0 Nisu prisutni * 1 Nedostatak apetita, ali jede bez nagovaranja * 2 Jede samo uz nagovaranje i nuđenje
13. Opći tjelesni simptomi
0 Nisu prisutni * 1 Osjećaj težine ili boli u udovima, ledima, glavi. Gubitak tjelesne snage i lako zamaranje * 2 Svaki od gornjih simptoma ako je tako izražen
14. Genitalni simptomi
0 Nisu prisutni * 1 Umjereni * 2 Jako izraženi
15. Hipohondrijski simptomi
0 Nisu prisutni * 1 Pojačano tjelesno samopromatranje * 2 Zabrinutost za svoje zdravlje * 3 česte pritužbe na smetnje, traženje pomoći itd. * 4 Hipohondrijske sumanutosti
16. Gubitak tjelesne težine
0 Manje od pola kilograma gubitka tjelesne težine u jednom tjednu * 1 Više od pola kilograma, ali manje od kilograma gubitka tjelesne težine u tjedan dana * 2 Više od kg tjelesne težine izgubljeno tijekom tjedan dana
17. Uvid u bolest
0 Uvida da je depresivan i bolestan * 1 Uvida bolest, ali je pripisuje lošoj prehrani, klimi, prepornom radu, infekciji, potrebi za odmorom itd. * 2 Potpuno negira bolest

Slika 2. Hamiltonova ocjenska ljestvica za depresiju

ZAKLJUČAK

Potreban je oprez kod preklapajućih simptoma uremije i depresije, odnosno, važno je pravovremeno otkriti depresivni poremećaj kod uremičnih bolesnika.

KLJUČNE RIJEČI
Uremija, koncentracija, umor, dijaliza

- Ukupan broj ispitanika (100)
- Ispitanici s umorom i gubitkom koncentracije (48)
- Ispitanici s potvrđenom depresijom (19)